

CCC_SOP_Verhalten bei allergischer Reaktionen bei ambulanter systemischer Tun.

Geltungsbereich

Patientenversorgung (CCC)

Mitgeltende Unterlagen

k.A.

1 Grundsätzliches

Allergische Reaktionen können während oder nach Applikation von potentiell allen Medikamenten auftreten. Unten sind solche aufgeführt, bei denen ein erhöhtes Risiko besteht.

1.1 Fremdproteine (z.B. Antikörper)

Häufig tritt eine allergische Reaktion bei Gabe von Fremdproteinen (z.B. Antikörper, enden auf **-mab**) auf.

- Alemtuzumab
- Cetuximab
- Daratumumab
- Elotuzumab
- Ipilimumab
- Nivolumab
- Pembrolizumab
- Obinutuzomab
- Ofatumumab
- Olaratumab
- Rituximab
- Immunglobuline wie Intratect u.a.

1.2 Chemotherapeutika

Chemotherapeutika, die häufig allergische Reaktionen verursachen, sind:

- Carboplatin
- Docetaxel
- Paclitaxel

2 Symptome einer allergischen Reaktion

- Juckreiz, Hautrötung, Urtikaria
- Schüttelfrost, Fieber
- Atemnot, Globusgefühl, Bronchospasmus
- Blutdruck-/Herzfrequenzabfall **oder**-anstieg
- Verwirrtheit
- Schock, Kreislaufstillstand

3 Maßnahmen

3.1 Maßnahmen der Pflege

- Infusion stoppen, Volumentherapie (NaCl 0,9% oder Glucose 5%) weiterlaufen lassen
- Arzt alarmieren

Version: 1	Ersteller: Meidenbauer, Norbert, 25.03.2020	Prüfer: Krause, Stefan, 25.03.2020	Freigeber: Beckmann, Matthias (i.A. Caroline, Preuß), 27.04.2020	Kenn-Nr.: UKER-8-24574	Seite 1 von 2
---------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------	------------------

CCC_SOP_Verhalten bei allergischer Reaktionen bei ambulanter systemischer Tur.

- Vitalparameter messen
- Notfallwagen bereitstellen
- Vorbereiten von Tavegil (Clemastin) 2 mg, Prednisolon (Prednisolut (SDH)) 250 mg zur i.v.-Gabe, 1 Ampulle Ranitic 50 mg, bei Luftnot auch Salbutamol zur Inhalation bzw. Salbutamol Dosieraerosol (s. Notfallset)

3.2 Ärztliche Maßnahmen (je nach Schweregrad)

- Stopp der Therapie
- Volumengabe mit NaCl 0,9%
- Tavegil (Clemastin) 2 mg i.v.
- 1 Ampulle Ranitic 50 mg i.v.
- Prednisolon (Prednisolut (SDH)) 250 mg.i.v.
- Bei Spastik: Inhalation mit Salbutamol 2,5 mg bzw. 2 Hübe Salbutamol
- **Bei lebensbedrohlichem Schock:**
- Reanimationsteam alarmieren
- 1 mg Adrenalin auf 10 ml NaCl 0,9% langsam fraktioniert (!) i.v. + ggf. Reanimation einleiten

4 Set allergische Reaktionen

Die genannten Medikamente stehen in allen Bereichen zur Verfügung, sowohl im Medikamentschrank als auch im Notfallwagen für den schnellen Zugriff.

Angesichts der häufigen Verabreichung solcher Medikamente in der Therapieambulanz wird dort zusätzlich ein „Set allergische Reaktionen“ in einer separaten Box bereitgehalten:

- 1 Salbutamol 100µg Dosieraerosol
- 3 Ampullen Prednisolon 250 mg (Prednisolut)
- 3 Ampullen Prednisolon 50 mg (Prednisolut)
- 5 Ampullen Salbutamol 2,5 mg Fertiginhalat
- 5 Ampullen Tavegil 2 mg (Clemastin)
- 5 Ampullen Ranitic 50 mg (Ranitidin)

Änderungshinweise:

07/2018 Salbutamol statt Berotec (NM).

Diese VA tritt ab sofort in Kraft.

Version: 1	Ersteller: Meidenbauer, Norbert, 25.03.2020	Prüfer: Krause, Stefan, 25.03.2020	Freigeber: Beckmann, Matthias (i.A. Caroline, Preuß), 27.04.2020	Kenn-Nr.: UKER-8-24574	Seite 2 von 2
---------------	--	---------------------------------------	--	---------------------------	------------------