Calquence® + Venclyxto®

© AMBORA

Diese Medikamente wurde von Ihrem Arzt/Ihrer Ärztin zur Behandlung Ihrer Krebserkrankung ausgewählt. Hier finden Sie wichtige Informationen zur Einnahme, möglichen Nebenwirkungen und zum Umgang mit Ihren Krebsmedikamenten. Sie können aktiv an Ihrer Therapie mitwirken, indem Sie die nachfolgenden Hinweise und Einnahmeempfehlungen beachten und die Medikamente regelmäßig einnehmen.

Calquence®

100 mg:
orangefarbene, ovale Tablette

Venclyxto®

10 mg 50 mg

100 mg

Allgemeine Angaben zu den Medikamenten

Calquence® 100 mg Tabletten, Wirkstoffname: Acalabrutinib

Venclyxto® 10 / 50 / 100 mg Tabletten, Wirkstoffname: Venetoclax

Einnahmegrund (Indikation): Krebserkrankung der Blutzellen / des Lymphsystems (sog. Chronische lymphatische Leukämie – CLL)

Wirkungsweise: Der Wirkstoff **Acalabrutinib** ist ein sogenannter „Kinasehemmer". Kinasen sind Proteine, die Wachstumssignale innerhalb der Zellen weitergeben und am Krebswachstum und der Verbreitung von Krebszellen im Körper beteiligt sind. Acalabrutinib hemmt die sog. „Bruton-Tyrosin-Kinase" (BTK) und soll so das Fortschreiten der Krebserkrankung verhindern. Der Wirkstoff **Venetoclax** unterstützt als sogenannter „BCL-2-Hemmer" die Wirkung. BCL-2 liegt in Leukämiezellen in großer Zahl vor, hilft den Krebszellen im Körper zu überleben und macht sie widerstandsfähiger gegenüber der Krebstherapie. Durch die Hemmung von BCL-2 führt Venetoclax zum Absterben der Krebszellen.

Dosis und Behandlungsschema

Wie oft und wann am Tag?

Empfohlene Anfangsdosis

(ggfs. wird die Dosis im Laufe der Therapie angepasst):

Kombination Calquence® + Venclyxto®:

Zyklus 1 – 2 (= Woche 1 – 8):

2 x täglich 1 Tablette Calquence® 100 mg

Einnahme jeweils mit einem Glas Wasser möglichst immer zur gleichen Uhrzeit (**Calquence®** morgens und abends im Abstand von ca. zwölf Stunden einnehmen, **Venclyxto®** bevorzugt am Morgen einnehmen).

Calquence® mit oder ohne Mahlzeit einnehmen.

Venclyxto® mit einer Mahlzeit einnehmen.

Ab Zyklus 3 (= Woche 9):

zusätzlich zu Calquence® (Dosierung siehe oben) Einnahme von Venclyxto®:

Woche 9:	1 x täglich 2 Tabletten Venclyxto® 10 mg
Woche 10:	1 x täglich 1 Tablette Venclyxto® 50 mg
Woche 11:	1 x täglich 1 Tablette Venclyxto® 100 mg
Woche 12:	1 x täglich 2 Tabletten Venclyxto® 100 mg
ab Woche 13:	1 x täglich 4 Tabletten Venclyxto® 100 mg

ggf. + Obinutuzumab Infusion, die an folgenden Tagen verabreicht wird:

☐ Medikament zur Vorbeugung eines sog. **Tumorlyse-Syndroms** (z.B. Allopurinol):

Wenn Sie…

- ...die Einnahme vergessen/versäumt haben: Einnahme kann nachgeholt werden, wenn es bei **Calquence®** noch mindestens 9 Stunden und bei **Venclyxto®** noch mindestens 16 Stunden bis zur nächsten geplanten Einnahme sind.
- …nach der Einnahme erbrechen mussten: erbrochene Dosis nicht ersetzen.
- …zu viele Tabletten eingenommen haben: bitte kontaktieren Sie Ihr Behandlungsteam.

Gibt es Vorsichtsmaßnahmen zu beachten?

- Lutschen, zerdrücken, zerkauen, zerschneiden oder zerbrechen Sie Ihre Tabletten nicht, sofern Sie keine anderslautenden Anweisungen erhalten haben.
- Waschen Sie sich vor und nach der Einnahme die Hände. Angehörige sollten beim Umgang mit den Krebsmedikamenten Einmalhandschuhe tragen.
- Fahren Sie beim Auftreten von Ermüdung oder Schwindel kein Auto und bedienen Sie keine gefährlichen Maschinen.
- Halten Sie sich möglichst wenig in der **Sonne** auf, achten Sie auf schützende Kleidung und Sonnencremes mit einem hohen Lichtschutzfaktor.
- Falls Sie **operiert** werden müssen, muss **Calquence®** ggfs. pausiert werden, da es die Blutungsneigung verstärken kann. Informieren Sie in diesem Fall unbedingt Ihr Behandlungsteam!

- Falls Sie oder Ihre Partnerin eine Schwangerschaft planen, sprechen Sie bitte mit Ihrem Behandlungsteam. Diese Arzneimittel können Risiken für das ungeborene Kind mit sich bringen.
- **Trinken Sie mindestens 1,5 – 2 Liter Wasser täglich. Dies ist vor allem in der Aufdosierungsphase von Venclyxto® sehr wichtig, um Nebenwirkungen (sog. Tumorlyse-Syndrom) vorzubeugen!**

Wie sollten die Medikamente aufbewahrt werden?

- In der **Originalverpackung** belassen, um Verwechslungen zu vermeiden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Bei **Raumtemperatur**, vor Sonneneinstrahlung (nicht auf der Fensterbank), Feuchtigkeit (nicht im Bad) und Hitze (nicht in der Küche) geschützt lagern.

Welche Nebenwirkungen können auftreten (Auswahl)?

- Durchfall oder Verstopfung
- Übelkeit und/oder Erbrechen
- Hautausschlag (achten Sie vorbeugend auf eine regelmäßige **Hautpflege**)
- Erhöhter Blutdruck (bitte regelmäßig kontrollieren)
- Erhöhte Blutungsneigung – z.B. Nasenbluten, „blaue Flecken“
- Erhöhte **Infektanfälligkeit** (meiden Sie Menschenmassen, öffentliche Verkehrsmittel und Menschen mit Erkältung oder anderen Infektionen)
- Ermüdung

Bitte informieren Sie bei folgenden Beschwerden umgehend Ihr Behandlungsteam:

- Fieber über 38°C
- Durchfall, der sich mit Medikamenten nicht stoppen lässt
- wenn Sie länger als 3 Tage keinen Stuhlgang hatten
- neu aufgetretene Hautveränderungen – als möglicher Hinweis auf eine bösartige Hauterkrankung
- Gürtelförmige, schmerzhafte Rötung und Bläschenbildung an der Haut – als möglicher Hinweis auf eine Gürtelrose (sog. Herpes Zoster)
- Blut im Urin oder schwarzer Stuhl – als möglicher Hinweis auf Blutungen
- anhaltend hoher Blutdruck (über 150/90 mm Hg)
- Herzklopfen, unregelmäßiger Herzschlag („Herzstolpern“) - als möglicher Hinweis auf eine Störung des Herzschlages
- Gedächtnisstörungen, Schläfrigkeit, Bewegungsstörungen, Sprachstörungen - als möglicher Hinweis auf eine Erkrankung des Gehirns (sog. PML)
- Taubheitsgefühle, starke Kopfschmerzen, Verwirrtheit, Sprach- oder Sehstörungen – als möglicher Hinweis auf einen Schlaganfall
- **oder wenn Sie unter anhaltenden oder anderen unklaren Beschwerden leiden!**

Gibt es Wechselwirkungen mit Medikamenten oder Lebensmitteln?

Ihre Krebsmedikamente können durch andere Medikamente beeinflusst werden. Auch mit Präparaten, die Sie ohne Rezept erhalten (z.B. pflanzliche Mittel, Nahrungsergänzungsmittel oder Vitamine) kann es Wechselwirkungen geben. Bitte informieren Sie deshalb Ihr Behandlungsteam, dass Sie diese Krebsmedikamente einnehmen! Das ist besonders wichtig, wenn sich Ihre Medikamente ändern. Folgende Wechselwirkungen mit rezeptfreien Präparaten und Lebensmitteln müssen beachtet werden:

- Nehmen Sie bitte keine **johanniskrauthaltigen** Tabletten/Kapseln oder Tees ein, da sonst die Wirkung Ihrer Krebsmedikamente abgeschwächt sein kann.
- Trinken Sie bitte keinen Grapefruitsaft und essen Sie keine **Grapefruits**, keine Sternfrüchte und Bitterorangen (Sevilla-Orangen, Pomeranzen) oder Bitterorangen-Produkte, da es sonst verstärkt zu Nebenwirkungen Ihrer Krebsmedikamente kommen kann.
- Halten Sie Rücksprache mit Ihrem Behandlungsteam, falls Sie **Acetylsalicylsäure** (z.B. **ASS**, Aspirin®) als Blutverdünner oder Schmerzmittel einnehmen, da das Blutungsrisiko durch **Calquence®** erhöht sein kann.

Wen kann ich bei Fragen anrufen?

Ihr Behandlungsteam:

Ärztlicher Bereitschaftsdienst: 116117

Bei lebensbedrohlichen Notfällen: 112

Stempel der Klinik / Praxis / Apotheke

gefördert durch Dr. August und Dr. Anni Lesmüller Stiftung
Deutsche Krebshilfe – Helfen. Forschen. Informieren.

Dieses Merkblatt wurde für Sie erstellt von:
AMBORA AMTS-Kompetenz- und Beratungszentrum orale Tumortherapie

CCC Comprehensive Cancer Center Erlangen-EMN
Europäische Metropolregion Nürnberg

Dieses Merkblatt ist als Ergänzung zur Gebrauchsinformation bzw. Fachinformation gedacht. Trotz sorgfältiger Prüfung wird keine Gewährleistung für Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Angaben und keinerlei Haftung für eventuelle Fehler noch für Schäden übernommen. © Sämtliche Rechte (z. B. Urheber- und Leistungsschutzrechte) dieses Merkblattes liegen bei der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) und beim Universitätsklinikum Erlangen (UKER). Arzneimittelmerkblatt Calquence® + Venclyxto®, Version: 2025-01, Stand: 20.06.2025. Bildquelle: Gelbe Liste, Textquellen: Fachinformation Calquence® Stand: 06.2025; Fachinformation Venclyxto® Stand: 09.2024